

INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA DISPENSACIÓN AMBULATORIA

SERVICIO DE FARMÁCIA
Hospital Duran i Reynals

INFORMACIÓN SOBRE PROLEUKIN® (Aldesleukina, viales de 18x10⁶ UI)

¿Cómo se debe administrar este medicamento?

- Se administra por vía subcutánea previa disolución.
- Disolución: añadir al polvo del vial 1.2mL de agua estéril para inyección, dirigir el agua hacia las paredes para no producir espuma. Girar suavemente hasta la disolución completa del polvo. No agitar.
- Si se olvida de administrarse una dosis hable con su médico.

¿Qué posibles efectos secundarios puede tener la Aldesleukina y que hacer cuando aparezcan?

Contacte inmediatamente con su médico si nota: dificultad para respirar, fuerte dolor en el pecho, gana peso rápidamente, reducción en la cantidad de orina, piel i ojos amarillos.

Molestias que aparecen con frecuencia son: síndrome gripal, fiebre, hipotensión, diarrea, náuseas y vómitos, anorexia, piel seca y molestias en el lugar de inyección.

¿Cuándo NO se debe tomar este medicamento?

- Si ha tenido alguna reacción alérgica a la aldesleukina
- En personas en edad fértil, que no utilicen métodos anticonceptivos eficaces.
- Madres lactantes.

Otras consideraciones durante el tratamiento con Aldesleukina.

- Evite conducir vehículos a motor y utilizar maquinaria.
- Durante el tratamiento con aldesleukina es más propenso a contraer infecciones, evite aglomeraciones, y estar en contacto con gente resfriada o con gripe.
- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar otros medicamentos.

¿Cómo se debe conservar este medicamento?

- En la nevera. Una hora antes de administrarse el tratamiento dejar a temperatura ambiente.
- En su envase original, protegido de la luz directa.

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals
Teléfono directo: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, junio de 2003.