

**INFORMACIÓN SOBRE AGRYLIN® (Anagrelide, cápsulas de 0.5 ó 1mg)**

Este medicamento se utiliza para disminuir el número de plaquetas en sangre en el tratamiento de una alteración sanguínea llamada trombocitemia.

**¿Cómo debe tomar este medicamento?**

- ◆ Las cápsulas deben de tragarse enteras con o sin comidas, no deben abrirse ni masticar.
- ◆ Si se le olvidó tomar el medicamento tómelo durante el mismo día, lo antes posible. Si ha transcurrido un día entero salte la dosis olvidada sin doblar la siguiente dosis.
- ◆ Se recomienda tomar medidas anticonceptivas eficaces en mujeres que estén en tratamiento con este medicamento.
- ◆ Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier otro medicamento, incluyendo medicación para molestias leves (resfriado común, dolor de cabeza...).

**¿Que posibles efectos secundarios tiene Agrylin ® y qué hacer en caso de que aparezcan?**

Contacte inmediatamente con su médico si tiene: una reacción alérgica grave (ronchas en la piel, dificultad al respirar), palpitaciones, dolor en el pecho, hinchazón de pies o tobillos.

Otros efectos secundarios más leves que puede tener son: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, flatulencia, diarrea, pérdida de apetito, somnolencia o sensación de cansancio, dolor de barriga o de espalda, hematoma con más frecuencia.

**¿Cuándo NO debe tomar este medicamento?**

- ◆ Si ha tenido alguna reacción alérgica al anagrelide.
- ◆ Si está embarazada o periodo de lactancia. Si sospecha que pueda estar embarazada, comuníquesele a su médico.

**¿Cómo debe conservarse el Agrylin®?**

Conserve este medicamento a temperatura ambiente, dentro de su envase original y protegido de la luz.