

**INFORMACIÓN SOBRE ARANESP® (Darbepoetin alfa, jeringas de 150 mcg)**

Medicamento para tratar la anemia, ayuda al organismo a producir glóbulos rojos.

**¿Cómo se ha de administrar este medicamento?**

- 20 minutos antes de administrar el medicamento sacar la jeringa de la nevera, así estará a temperatura ambiente.
- Se administra por vía subcutánea (debajo de la piel) en la parte externa de brazos i piernas o en la barriga. Cada dosis se pone en un punto diferente.  
**(ver hoja posterior)**
- Olvido de una dosis; si no ha pasado más de un día puede ponérsela. No administrar dos dosis en un mismo día.

**¿Que efectos secundarios se pueden presentar en el tratamiento con Aranesp®?**

Hable urgentemente con su médico si nota:

- Dolor al pecho
- Enrojecimiento de la piel, picor o bampollas
- Dificultad al respirar, o respiración irregular.

Consulte con su médico si nota otras molestias como: diarrea, síntomas gripales, dolor de cabeza, molestias en el estomago, nauseas, dolor en el lugar de la inyección.

**¿Cuándo NO se debe tomar este medicamento?**

- Si ha tenido alguna reacción alérgica al Aranesp®
- Si tiene hipertensión no controlada.

**¿Consideraciones en relación a medicamentos o alimentos?**

- Durante este tratamiento es necesario comer alimentos ricos en hierro, como huevos, carne roja, lentejas, espinacas,...
- También se debe tomar suplementos de hierro. El hierro es necesario para la formación de glóbulos rojos.

**¿Cómo se debe conservar el Aranesp®?**

- Se guarda a la nevera (2-4°C), no congelar.
- No agitar.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals

Teléfono directo: 93-2607808

L'Hospitalet de Llobregat, noviembre de 2005.


# Cómo utilizar correctamente

## Aranesp® SureClick™

### Escoja el lugar de inyección



### Retire el protector gris



**A.**



Coloque SureClick™ en el lugar de inyección en ángulo recto (90°) y manténgalo presionado firmemente contra la piel.

**B.**



Pulse y suelte inmediatamente el botón rojo de activación. Oirá un "click". No levante SureClick™ de su posición.

**Click!**



Después de 15 segundos o tras escuchar un segundo "click" (lo que ocurra primero) ya puede levantar SureClick™ del lugar de inyección.