

INFORMACIÓN SOBRE ARANESP® (Darbepoetin alfa, jeringas de 500 mcg)

Medicamento para tratar la anemia, ayuda al organismo a producir glóbulos rojos.

¿Cómo se ha de administrar este medicamento?

- 20 minutos antes de administrar el medicamento sacar la jeringa de la nevera, así estará a temperatura ambiente.
- Se administra por vía subcutánea (debajo de la piel) en la parte externa de brazos i piernas o en la barriga. Cada dosis se pone en un punto diferente.
(ver hoja posterior)
- Olvido de una dosis; si no ha pasado más de un día puede ponérsela. No administrar dos dosis en un mismo día.

¿Que efectos secundarios se pueden presentar en el tratamiento con Aranesp®?

Hable urgentemente con su médico si nota:

- Dolor al pecho
- Enrojecimiento de la piel, picor o bampollas
- Dificultad al respirar, o respiración irregular.

Consulte con su médico si nota otras molestias como: diarrea, síntomas gripales, dolor de cabeza, molestias en el estomago, nauseas, dolor en el lugar de la inyección.

¿Cuándo NO se debe tomar este medicamento?

- Si ha tenido alguna reacción alérgica al Aranesp®
- Si tiene hipertensión no controlada.

¿Consideraciones en relación a medicamentos o alimentos?

- Durante este tratamiento es necesario comer alimentos ricos en hierro, como huevos, carne roja, lentejas, espinacas,...
- También se debe tomar suplementos de hierro. El hierro es necesario para la formación de glóbulos rojos.

¿Cómo se debe conservar el Aranesp®?

- Se guarda a la nevera (2-4°C), no congelar.
- No agitar.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals

Teléfono directo: 93-2607808

L'Hospitalet de Llobregat, noviembre de 2005.


Cómo utilizar correctamente

Aranesp[®] SureClick[™]

Escoja el lugar de inyección



Retire el protector gris



A.



Coloque SureClick[™] en el lugar de inyección en ángulo recto (90°) y manténgalo presionado firmemente contra la piel.

B.



Pulse y suelte inmediatamente el botón rojo de activación. Oirá un "click". No levante SureClick[™] de su posición.

Click!



Después de 15 segundos o tras escuchar un segundo "click" (lo que ocurra primero) ya puede levantar SureClick[™] del lugar de inyección.