

## INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA DISPENSACIÓN AMBULATORIA

SERVICIO DE FARMÀCIA  
Hospital Duran i Reynals

### INFORMACIÓN SOBRE NEORECORMON® (Epoetina beta, jeringas de 10.000 UI)

Medicamento para tratar la anemia, ayuda al organismo a producir glóbulos rojos.

#### ¿Cómo se ha de administrar este medicamento?

- 20 minutos antes de administrar el medicamento sacar la jeringa de la nevera, así estará a temperatura ambiente.
- Se administra por vía subcutánea (debajo de la piel) en los brazos o en la barriga. Cada dosis se pone en un punto diferente. Sacar el aire de la jeringa antes de administrar el fármaco.
- Si se olvida ponerse una dosis, si no ha pasado más de un día puede ponérsela. No administrar dos dosis en un mismo día.

#### ¿Que efectos secundarios se pueden presentar en el tratamiento con Neorecormon®?

Hable urgentemente con su médico si nota:

- Dolor al pecho
- Enrojecimiento de la piel, picor o bampollas
- Dificultad al respirar, o respiración irregular.

Consulte con su médico si nota otras molestias como: diarrea, síntomas gripales, dolor de cabeza, molestias en el estomago, nauseas.

#### ¿Cuándo NO se debe tomar este medicamento?

- Si ha tenido alguna reacción alérgica al Neorecormon®
- Si tiene hipertensión no controlada.

#### Consideraciones con otros medicamentos o alimentos

- Durante este tratamiento es necesario comer alimentos ricos en hierro, como huevos, carne roja, lentejas, espinacas,...
- También se debe tomar suplementos de hierro. El hierro es necesario para la formación de glóbulos rojos.

#### ¿Cómo se debe conservar el Neorecormon®?

- Se guarda a la nevera (2-4°C), no congelar.
- No agitar.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals  
Teléfono directo: 93-2607808  
L'Hospitalet de Llobregat, marzo de 2003.