

INFORMACIÓN SOBRE GLIVEC® (Imatinib, comprimidos 100mg)

¿Cómo debe tomar el medicamento?

- Con alimentos y con un gran vaso de agua
- Tomar la cápsula entera, no debe abrirla ni aplastarla
- Si se olvida de tomarla, si sólo han pasado hasta 4 horas tómese la en ese momento, si ha pasado más tiempo no se la tome, espere a la siguiente toma. No doblar la dosis para compensar.

¿Qué posibles efectos secundarios tiene Glivec® y qué hacer en caso de que aparezcan?

Consulte con su médico en caso de detectar la presencia de alguno de estos efectos:

- Reacciones alérgicas: picor de ojos o aumento del lagrimeo, cara o manos hinchadas, sequedad de piel, erupción cutánea
- Disminuye la cantidad o frecuencia de la orina. Cambia el color de la orina
- Dolor o hinchazón del abdomen
- Pérdida de apetito i debilidad
- Rápido aumento de peso
- Dolor de cabeza.
- Náuseas, vómitos o diarreas
- Calambres

Comunique también a su médico si presenta de forma continua cualquier otro efecto.

¿Cuándo NO debe tomar el medicamento?

- En caso de alergia a alguno de los componentes del medicamento
- Mujeres que estén amamantando a sus hijos
- Mujeres embarazadas, excepto si fuese claramente necesario

¿Puedo tomar otros medicamentos junto con Glivec®?

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de usar otra medicación como:

- Analgésicos o preparados antigripales que contengan paracetamol.
- Antibióticos i antifúngicos (eritromicina, claritromicina, metronidazol, rifabutina, rifampicina).
- Pastillas para el control de la natalidad (anticonceptivos).
- Medicamentos para el corazón (amiodarona) o para la presión arterial.
- Medicamentos para controlar el colesterol.
- Medicamentos para la epilepsia (fenitoina, fenobarbital).
- Sedantes y medicación para la depresión.
- Otros: corticoides, omeprazol, ondansetron, cimetidina, ciclosporina, tacrólimus, fentanilo.

No es una lista completa de los fármacos que pueden alterar el efecto del Glivec®. Por ello es importante que nunca use los medicamentos sin consultar a su médico.

¿Cómo debe conservarse Glivec®?

- Mantener el medicamento en el embalaje original a temperatura ambiente (>30°C).
- Protegerlo de la luz directa, del calor excesivo y la humedad.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Pera a cualquier consulta trucar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals

Teléfono directo: 93-2607808

L'Hospitalet de Llobregat, mayo de 2003.