

INFORMACIÓN SOBRE LOUSTINA® (Lomustina, cápsulas de 40mg)

¿Cómo se debe tomar este medicamento?

- Tome el número de cápsulas que le ha indicado su médico en ayunas, es decir, 1 hora antes o dos horas después de haber comido.
- La dosis indicada se ha de tomar de una sola vez. Se recomienda tomarla antes de acostarse así en la cama las náuseas que produce no son tan molestas.
- Si vomita inmediatamente después de tomar la medicación hable con su médico.

Consideraciones especiales durante este tratamiento:

- Hacer una higiene bucal adecuada, con un cepillo de dientes suave.
- Consulte a su médico antes de ponerse una vacuna o tomar otra nueva medicación.
- No rompa ni abra las cápsulas. Si se abre una cápsula y entra en contacto con el polvo de dentro lávese con mucha agua.
- Si se olvida de tomar una dosis hable con su médico.
- No se recomienda tomar bebidas alcohólicas durante este tratamiento.
- Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar otros medicamentos.
- Evite aglomeraciones de gente y estas en contacto con gente resfriada o con alguna otra infección, ya que mientras tome este medicamento es más sensible a las infecciones.
- Tome medidas anticonceptivas eficaces durante este tratamiento, tanto si es hombre como si es mujer.

¿Que posibles efectos secundarios puede tener el lomustina y que hacer cuando aparezcan?

- ✓ Contacte inmediatamente con su médico si nota: si nota una reacción alérgica (picor y enrojecimiento en la piel de todo el cuerpo, problemas respiratorios,...), fiebre, dolor de garganta, sangre en orina, hemorragias (nasales,...), diarrea grave, molestias bucales que le impidan beber líquidos.
- ✓ Consulte con su médico si nota: pérdida de apetito, caída del pelo.
- ✓ Otros efectos secundarios frecuentes son: náuseas, vómitos, desorientación, somnolencia, molestias bucales.

¿Cuándo NO se debe tomar este medicamento?

- Si ha tenido alguna reacción alérgica a la lomustina.
- Si esta embarazada o durante la lactancia. Si sospecha que puede estar embarazada comuníquesele a su médico.

¿Cómo se debe conservar este medicamento?

- A temperatura ambiente.
- En su envase original, protegido del calor y de la luz directa.

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals
Teléfono directo: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, junio de 2003.