

INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA DISPENSACIÓN AMBULATORIA

SERVICIO DE FARMACIA
Hospital Duran i Reynals

INFORMACIÓN SOBRE MELFALAN® (Melfalan, comprimidos 2mg)

¿Cómo se debe tomar este medicamento?

- Tome el número de comprimidos que le ha indicado su médico en ayunas, es decir, 1 hora antes o dos horas después de haber comido.
- Los comprimidos se han de tragar enteros con agua y no masticarlos.

Consideraciones especiales durante este tratamiento:

- Hacer una higiene bucal adecuada, con un cepillo de dientes suave.
- No rompa ni triture los comprimidos si no es estrictamente necesario. Después de manipular comprimidos lávese las manos con jabón y con mucha agua.
- Si se olvida de tomar una dosis deje pasar esta dosis y continúe con la dosis siguiente. No tomar dosis doble para compensar.
- No se recomienda tomar bebidas alcohólicas durante este tratamiento.
- Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar otros medicamentos.
- Evite aglomeraciones de gente y estar en contacto con gente resfriada o con alguna otra infección, ya que mientras tome este medicamento es más sensible a las infecciones.

¿Qué posibles efectos secundarios puede tener el melfalan y qué hacer cuándo aparezcan?

- ✓ Contacte inmediatamente con su médico si nota: si nota una reacción alérgica (picor y enrojecimiento en la piel de todo el cuerpo, problemas respiratorios,...), fiebre, dolor de garganta, tos importante, hemorragias (nasales,...), diarrea grave, molestias bucales que le impidan beber líquidos.
- ✓ Consulte con su médico si nota: náuseas, vómitos, pérdida de apetito, caída del pelo.

¿Cuándo NO se debe tomar este medicamento?

- Si ha tenido alguna reacción alérgica al melfalan o alguno de los componentes de este medicamento (excipientes como lactosa).
- Si está embarazada o durante la lactancia. Si sospecha que puede estar embarazada comuníquesele a su médico.

¿Cómo se debe conservar este medicamento?

- A temperatura ambiente.
- En su envase original, protegido del calor y de la luz directa.

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals
Teléfono directo: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, junio de 2003.