

**INFORMACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA
DISPENSACIÓN AMBULATORIA**

SERVICIO DE FARMÀCIA
Hospital Duran i Reynals

INFORMACIÓN SOBRE ONTOSEIN® (Orgoteina, vial de 8 mg)

Medicamento para prevenir i tratar los efectos secundarios de la radioterapia en tumores de vejiga.

¿Cómo se ha de administrar este medicamento?

- Prevención: 4-8mg vía intramuscular después de la sesión de radioterapia.
- Tratamiento: 4-8mg vía intramuscular tres veces a la semana hasta la desaparición de los síntomas (máximo 7 semanas).

¿Que efectos secundarios se pueden presentar en el tratamiento con Ontosein®?

Hable urgentemente con su médico si nota: una reacción alérgica generalizada.

Otros efectos secundarios leves que pueden aparecer son: hinchazón, dolor o picor en el lugar de la inyección.

¿Cuándo NO se debe tomar este medicamento?

- Si ha tenido alguna reacción alérgica al Ontosein®
- Si tiene la enfermedad de Wilson.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals
Teléfono directo: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, marzo de 2003.