

INFORMACIÓ SOBRE NEULASTA® (PEGFILGRASTIM, jeringas de 6 mg)

**¿Cómo debe administrarse este medicamento?**

- ◆ Este medicamento se administra en inyección por debajo de la piel (vía subcutánea). La administración será aproximadamente a la misma hora cada día del tratamiento.
- ◆ Los sitios más adecuados para la inyección son la parte posterior de los antebrazos, parte superior de los muslos y el abdomen, excepto alrededor del ombligo. Cambie cada vez el lugar de inyección para evitar dolor al pincharse.

Administración:

- ✓ Saque el medicamento del frigorífico (30-45 minutos antes de la inyección).
- ✓ Lávese cuidadosamente las manos.
- ✓ Antes de inyectar el medicamento quite la cubierta de la aguja y apuntando hacia arriba observe si hay burbujas, si es así elimínelas empujando el émbolo de la jeringa para eliminar el aire.
- ✓ Desinfecte la piel con un algodón con alcohol y pellizque la piel sin apretar.
- ✓ Inserte toda la aguja en la piel e inyecte el líquido lentamente manteniendo pellizcada la piel.
- ✓ Tras inyectar retire la aguja y suelte la piel, desinfecte la piel con algodón limpio con alcohol.
- ✓ Por último ponga la jeringa usada en el recipiente de desecho adecuado.

Otras consideraciones al iniciar este tratamiento:

- ✓ Si está embarazada, cree que pueda estarlo o lo está intentando dígaselo a su médico.
- ✓ Si se olvida una dosis, consulte con su médico, nunca se administre una dosis doble para compensar.
- ✓ Informe a su médico o farmacéutico si toma o antes de tomar cualquier medicamento.

**¿Que posibles efectos secundarios tiene Neulasta® y que hacer en caso de que aparezcan?**

Deje de administrarse el medicamento y contacte inmediatamente con su médico si: presenta alergia generalizada, si nota sarpullido por todo el cuerpo, dificultad al respirar, pulso rápido o sudoración.

Hable con su médico, si nota: fiebre, resfriado, sangrado o hematomas inusuales, picor o sarpullido en la piel; dificultad al respirar, llagas en la cara, labios, boca o garganta, dolor abdominal o en el extremo del hombro, dolor o dificultad al orinar.

Otros síntomas leves son: dolor muscular (piernas, espalda,...); náuseas o pérdida de apetito; dolor y enrojecimiento en el lugar de inyección; dolor de cabeza; diarrea.

**¿Cuándo NO debe administrarse este medicamento?**

- ◆ Si es alérgico a pegfilgrastim o alguno de los componentes del medicamento.
- ◆ Durante la lactancia.

**¿Cómo debe conservar el Neulasta®?**

- ◆ Guarde las jeringas en la nevera, no los congele ni los exponga a la luz directa.
- ◆ MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals

Teléfono directo: 93-2607808

L'Hospitalet de Llobregat, abril de 2004.