

INFORMACIÓN SOBRE NATULAN® (Procarbacina, cápsula 50mg)

¿Cómo se debe tomar este medicamento?

- Tome el número de cápsulas que le ha indicado su médico con abundante agua.
- Si vomita inmediatamente después de tomar este medicamento llame a su médico.

Consideraciones especiales durante este tratamiento:

- Si se olvida de tomar una dosis, tómela lo antes posible a no se que este muy cerca de la siguiente dosis. No tomar dosis doble para compensar.
- No se recomienda tomar bebidas alcohólicas durante este tratamiento.
- No se recomienda tomar queso durante el tratamiento con procarbazina.
- Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar otros medicamentos.
- Evite aglomeraciones de gente y estas en contacto con gente resfriada o con alguna otra infección, ya que mientras tome este medicamento es más sensible a las infecciones.
- Hable con su médico antes de ponerse alguna vacuna.
- Durante este tratamiento tome medidas anticonceptivas eficaces.
- No se recomienda conducir vehículos ni manejar maquinaria pesada, por la somnolencia que puede producir este tratamiento.

¿Qué posibles efectos secundarios puede tener el Natulan ® y qué hacer cuándo aparezcan?

- ✓ Contacte inmediatamente con su médico si nota: si nota una reacción alérgica (picor y enrojecimiento en la piel de todo el cuerpo, problemas respiratorios,...), fiebre, dolor de garganta, hemorragias (nasales,...), diarrea grave, molestias bucales que le impidan beber líquidos, confusión.
- ✓ Hable con su médico si aparece: hiper-pigmentación cutánea, hematomas.
- ✓ Otros efectos secundarios frecuentes, que suelen aparecer solo durante los primeros días de tratamiento son: náuseas y vómitos, pérdida de apetito.

¿Cuándo NO se debe tomar este medicamento?

- Si ha tenido alguna reacción alérgica a la procarbazina.
- Si esta embarazada o durante la lactancia. Si sospecha que puede estar embarazada comuníquesele a su médico.

¿Cómo se debe conservar este medicamento?

- A temperatura ambiente.
- En su envase original, protegido del calor, la humedad y la luz directa.

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals
Teléfono directo: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, junio de 2003.