

INFORMACIÓN SOBRE THALIDOMID® (Talidomida, comprimidos de 50mg)

¿Cómo se debe tomar este medicamento?

- Se ha de tomar por la noche al menos una hora después de cenar y con un vaso de agua.
- Si se olvida de tomar una dosis, tómela lo más pronto posible durante el mismo día. No tomar dosis doble para compensar.
- Durante el tratamiento utilice dos métodos anticonceptivos, desde 4 semanas antes de comenzar hasta 4 semanas después de finalizar el tratamiento. Estas medidas anticonceptivas son necesarias tanto si es hombre como si es mujer. Este medicamento puede causar defectos en el feto.
- No se puede beber alcohol durante el tratamiento con talidomida.

¿Qué posibles efectos secundarios puede tener la Talidomida y qué hacer cuándo aparezcan?

Al inicio del tratamiento en casi todos los pacientes aparece estreñimiento, sedación, cansancio, somnolencia, y reducción de la capacidad de reacción.

Consulte con su médico si nota: reacción alérgica generalizada, fiebre, infecciones, mareo al levantarse, hormigueo o insensibilidad en pies y manos, ...

¿Cuándo NO se debe tomar este medicamento?

- Si es mujer en período reproductivo y no utiliza dos métodos anticonceptivos.
- Si es hombre activo sexualmente y no utiliza preservativos.
- Si ha tenido alguna reacción alérgica a este medicamento.
- Si esta embarazada, o puede estarlo.
- Durante la lactancia.

Otras consideraciones durante el tratamiento con Talidomida;

- Evite conducir vehículos a motor, este medicamento puede producir somnolencia.
- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar otros medicamentos.

¿Cómo se debe conservar este medicamento?

- A temperatura ambiente.
- En su envase original, protegido de la humedad y de la luz directa.

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals

Teléfono directo: 93-2607808

L'Hospitalet de Llobregat, marzo de 2003.