

INFORMACIÓN SOBRE TEMODAL® (Temozolamida, cápsulas de 5, 20, 100, 250 mg.)

¿Cómo se debe tomar este medicamento?

- ◆ Tome las cápsulas en ayunas.
- ◆ Las cápsulas deben de tragarse enteras con un vaso de agua, no deben abrirse ni masticar.

Consideraciones especiales durante su toma:

- ◆ Si por accidente se abre o se daña una cápsula, evite inhalar cualquier componente de la cápsula o el contacto con piel y mucosas (ojos, nariz...). Si esto ocurriese lave la piel que ha estado en contacto, con agua y jabón, y la nariz y los ojos sólo con agua.
- ◆ Es posible que se le prescriba otro medicamento para tomar antes y/o tras Temodal® para evitar o controlar las náuseas que pueda presentar.
- ◆ Si se le olvidó tomar el medicamento, tómelo lo antes posible durante el mismo día. Si ha transcurrido un día entero, consulte con su médico; no doble la siguiente dosis, a menos que su médico se lo indique así.
- ◆ Se recomienda tomar medidas anticonceptivas eficaces tanto en hombres como en mujeres que estén en tratamiento con este medicamento.
- ◆ Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier otro medicamento, incluyendo medicación para molestias leves (resfriado común, dolor de cabeza...), vitaminas y "hierbas medicinales"; e informe a su médico si ya las está tomando.
- ◆ Contacte con su médico antes de cualquier vacunación.

¿Cuándo NO debe tomar Temodal®?

- ◆ Si ha tenido una reacción alérgica o es alérgico a temozolamida o alguno de los componentes de las cápsulas de este medicamento (excipientes como la lactosa, o de la cápsula como la gelatina).
- ◆ Si es alérgico a dacarbazina.
- ◆ Si está embarazada o periodo de lactancia. Si sospecha que pueda estar embarazada, comuníquese a su médico.

¿Qué posibles efectos adversos tiene Temodal® y qué hacer en caso de que aparezcan?

El tratamiento con Temodal® provoca una reducción de ciertos tipos de células sanguíneas. Esto puede hacerle más "propenso" a presentar hematomas o hemorragias, anemia, fiebre o mayor frecuencia de infecciones.

- ◆ Contacte inmediatamente con su médico si tiene una reacción alérgica grave (ronchas en la piel, dificultad al respirar).
- ◆ Consulte a su médico si presenta fiebre, náuseas o vómitos, mareos, somnolencia, debilidad, sangrado y/o hematomas inusuales.
- ◆ Otros efectos adversos que se pueden presentar en el tratamiento con Temodal®: pérdida de apetito o peso, diarrea, erupción cutánea, dolor, caída de cabello, escalofríos picor, o alteraciones del gusto.

¿Cómo debe conservar el Temodal®?

- ◆ Conserve este medicamento a temperatura ambiente i dentro su envase original.

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals
Teléfono directo: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, marzo de 2003.