

**INFORMACIÓN SOBRE VESANOID® (Tretinoína, comprimidos de 10mg)**

**¿Cómo se debe tomar este medicamento?**

- Se ha de tomar la dosis diaria dividida en dos tomas, en el desayuno y en la cena.
- Si se olvida de tomar una dosis, tómela lo más pronto posible siempre y cuando no este cerca de la siguiente dosis. No tomar dosis doble para compensar.

**¿Qué posibles efectos secundarios puede tener la Tretinoína y qué hacer cuándo aparezcan?**

Contacte inmediatamente con su médico si nota: fiebre inexplicable, problemas respiratorios o de visión, dolor de cabeza, dolor en el pecho, dolor de huesos, picor y enrojecimiento en la piel de todo el cuerpo.

Consulte con su médico si nota: piel seca, boca seca, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, debilidad y cansancio.

**¿Cuándo NO se debe tomar este medicamento?**

- Si ha tenido alguna reacción alérgica a la tretinoína, a la vitamina A o cualquiera de sus derivados.
- Si esta embarazada o puede estarlo, este medicamento puede producir malformaciones en el feto.
- Durante la lactancia.

Otras consideraciones durante el tratamiento con Tretinoína.

- Evite conducir vehículos a motor y utilizar maquinaria, ya que este medicamento puede producir mareos y dolores fuertes de cabeza.
- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar otros medicamentos.

**¿Cómo se debe conservar este medicamento?**

- A temperatura ambiente.
- En su envase original, protegido del calor y de la luz directa.

**MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals  
Teléfono directo: 93-2607808  
L'Hospitalet de Llobregat, junio de 2003.