

INFORMACIÓN SOBRE NAVELBINE® (Vinorelbina, cápsulas de 20 o 30 mg)

¿Cómo se ha de tomar este medicamento?

- ◆ Recorte el blíster por la línea punteada, quite el plástico blanco i presione para sacar la cápsula.
- ◆ Tome las cápsulas que el médico le ha indicado después de un desayuno o comida ligeros.
- ◆ No abra ni mastique las cápsulas. Traguelas enteras con ayuda de un vaso de agua.

Consideraciones especiales con este tratamiento:

- ◆ Si una cápsula se abre o está dañada, evite el contacto del líquido del interior con la piel y los ojos. Si se produjera contacto, limpie el área afectada con solución salina o agua y contacte con su médico. Limpie las superficies (suelo, mesa...) que hayan estado en contacto con el producto con lejía.
- ◆ Es posible que le prescriban un medicamento para tomar antes o después de Navelbine® con e fin de evitar o controlar las náuseas y vómitos que se pueden presentar.
- ◆ En caso de vómito no repita la dosis de Navelbine®.
- ◆ Se recomienda tomar medidas anticonceptivas tanto en hombres como en mujeres.
- ◆ Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar otros medicamentos, incluyendo medicación para molestias leves (resfriado, dolor de cabeza, ...), vitaminas y "hierbas medicinales".
- ◆ Informe a su médico si ha sufrido estreñimiento severo o si está en tratamiento con morfina o derivados.

¿Cuándo NO se ha de tomar Navelbine®?

- ◆ Si ha sufrido una reacción alérgica a vinorelbina o a alguno de los componentes de las cápsulas.
- ◆ Si es alérgico a otros alcaloides de la vinca como vincristina o vinblastina.
- ◆ En caso de enfermedad hepática grave.
- ◆ Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte la absorción gastrointestinal o se ha sometido a una intervención quirúrgica de resección del estómago o del intestino.
- ◆ Si está embarazada o en periodo de lactancia. Si sospecha que puede estar embarazada, comuníquelo a su médico.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer con este tratamiento y qué hacer en caso de que aparezcan?

El tratamiento con Navelbine® disminuye el número de determinados tipos de células sanguíneas, hecho que puede aumentar el riesgo de padecer hemorragias o hematomas, anemia, fiebre o infecciones.

- ◆ Contacte inmediatamente con su médico si tiene una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar, ...).
- ◆ Consulte con su médico si tiene fiebre, estreñimiento, náuseas o vómitos, diarrea, mareos, somnolencia, debilidad, sangrados y/o hematomas importantes.
- ◆ Otros efectos adversos que se pueden presentar con el tratamiento con Navelbine®: pérdida de hambre, dolor, caída del cabello, fiebre, cansancio.

¿Cómo se conserva Navelbine®?

- ✓ Consérvelo en la nevera dentro del envase original. No congelar.

MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.