

**INFORMACIÓ SOBRE VFEND® (Voriconazol, comprimidos 200 mg)**

**¿Cómo se debe tomar éste medicamento?**

- Tome los comprimidos indicados por el médico en ayunas, es decir, 1 hora antes o dos horas después de las comidas.
- Los comprimidos se deben tragar enteros con agua y no masticarlos.
- Si se olvida de tomar una dosis, tome la siguiente cuando le toque. No doblar la dosis para compensar.

**¿Qué efectos secundarios se pueden presentar en el tratamiento con Vfend®?**

- Hable inmediatamente con su médico si presenta erupción grave de la piel o ampollas.
- Comuníquese a su médico si tiene dolor de estómago o si las heces presentan una consistencia diferente.
- Alteraciones más frecuentes: Alteraciones de la visión, fiebre, erupción en la piel, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, inflamación de las extremidades.
- Otras: cambios en la presión sanguínea, cambios en el ritmo cardíaco, mareo, picor, debilidad, dolor de espalda, síntomas gripales, tos, hormigueo.

Hable con su médico si cualquiera de estos efectos adversos persiste o son molestos. Hable también con su médico si nota alguna otra molestia.

**¿Cuándo NO se debe tomar este medicamento?**

- En caso de alergia a alguno de los componentes del medicamento.
- Mujeres en periodo de lactancia.
- Mujeres embarazada, excepto si fuese estrictamente necesario.

**¿Se pueden tomar otros medicamentos con Vfend®?**

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar alguna otra medicación.  
**NO DEBE TOMAR** ninguno de éstos medicamentos mientras se encuentre en tratamiento con Vfend®:
  - Terfenadina, y Astemizol (utilizados para la alergia)
  - Carbamazepina (para las convulsiones)
  - Cisaprida (para problemas digestivos).
  - Pimozida (para trastornos mentales).
  - Quinidina (para arritmias cardíacas)
  - Rifampicina (para el tratamiento de la tuberculosis).
  - Fenobarbital (para el insomnio grave y las convulsiones).
  - Alcaloides ergotamínicos (p. Ej. Ergotamina, dihidroergotamina; utilizados para la migraña).
  - Sirolimus (para pacientes trasplantados)
- Comuníquese a su médico si está tomando alguno de los medicamentos siguientes, ya que puede ser necesario un ajuste de la dosis:
  - Rifabutin (utilizado para el tratamiento de la tuberculosis)
  - Fenitoína (utilizado para tratar la epilepsia)
- Comuníquese también a su médico si está tomando alguno de los medicamentos siguientes:
  - Warfarina y otros anticoagulantes (fenprocumon, acenocumarol; utilizados para disminuir la coagulación de la sangre).
  - Ciclosporina, Tacrolimus (utilizados para pacientes trasplantados)
  - Sulfonilureas (para la diabetes)
  - Estatinas (para reducir los niveles de colesterol)
  - Benzodiazepinas (para el insomnio grave y la ansiedad)
  - Omeprazol (para el tratamiento de las úlceras)

**¿Cómo se debe conservar el Vfend®?**

- A temperatura ambiente (<30°C) y en su envase original.
- Protegerlo de la luz del calor excesivo y de la humedad.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Para cualquier consulta llamar al Servicio de Farmacia. Hospital Duran i Reynals

Teléfono directo: 93-2607808

L'Hospitalet de Llobregat, abril de 2004.