

INFORMACIÓ SOBRE PROLEUKIN® (Aldesleukina, vials de 18x10⁶ UI)

¿Com s'ha d'administrar aquest medicament?

- Per via subcutània prèvia dissolució.
- Dissolució: afegir al vial 1.2mL d'aigua estèril per injecció, dirigir l'aigua cap a les parets del vial per no produir escuma. Girar suaument el vial fins a la dissolució completa del fàrmac. No agitar.
- Si s'oblida d'administrar-se una dosi parli amb el seu metge.

¿Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Proleukin?

Contacti immediatament amb el seu metge si nota: dificultat per a respirar, dolor intens al pit, reducció de la quantitat d'orina, augment ràpid de pes o pell i ulls grocs.

Molèsties que apareixen amb freqüència són: símptomes de grip, febre, hipotensió, diarrea, nàusees i vòmits, anorèxia, pell seca i molèsties al lloc d'injecció.

¿Quan NO s'ha de prendre aquest medicament?

- Si ha tingut cap reacció al·lèrgica a l'aldesleukina.
- Persones d'edat fèrtil, que no prenguin mesures anticonceptives eficaces.
- Si està alletant.

Altres consideracions durant el tractament amb Proleukin.

- No es convenient conduir vehicles a motor ni utilitzar màquines pesades.
- Durant el tractament amb aldesleukina es més propens a contraure infeccions, eviti aglomeracions, el contacte amb gent refredada o amb grip.
- Pregunteu al vostre metge o farmacèutic abans de prendre cap altra medicació.

¿Com s'ha conservar la Proleukin?

- A la nevera. Tregui l'envàs de la nevera un hora abans de l'administració per a que estigui a temperatura ambient a l'hora de l'administració.
- En l'envàs original protegit de la llum directa.

MANTENIR ELS MEDICAMENTS FORA DE L'ABAST DELS NENS.

Per a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals
Telèfon directe: 93-2607808

L'Hospitalet de Llobregat, juny de 2003.