

INFORMACIÓ SOBRE ARANESP® (Darbepoetina alfa, xeringues de 150mcg)

Medicament per a tractar l'anèmia, ajuda al cos a produir glòbuls vermells

¿Com s'ha d'administrar aquest medicament?

- Treure de la nevera el medicament 20 minuts abans d'administrar-lo, així s'administrarà a temperatura ambient.
- S'administra per via subcutània (sota la pell) a la part externa de les extremitats o a la panxa, cada dosi a un lloc diferent del cos. **(veure full posterior)**
- Si s'oblida d'administrar-se una dosi pot posar-se-la durant el mateix dia. No posar-se dues dosi en un mateix dia.

¿Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Aranesp®?

Parli urgentment amb el seu metge si nota:

- Dolor al pit.
- Envermelliment de la pell, picor o butllofes
- Dificultat al respirar, o respiració irregular.

Parli també amb el seu metge si nota cap altra molèstia, com: diarrea, símptomes gripals, mal de cap, malestar al estómac, nàusees, dolor al lloc d'injecció.

¿Quan NO s'ha de prendre aquest medicament?

- Si ha presentat cap reacció al·lèrgica a aquest medicament.
- Si té hipertensió no controlada.

¿Consideracions amb altres medicaments o aliments durant el tractament amb Aranesp®?

- Durant aquest tractament es necessari menjar aliments que continguin ferro, com ous, carn, llentilles, espinacs,...
- També es deu prendre suplement de ferro.

¿Com s'ha de conservar el Aranesp®?

- A la nevera (2-4°C). No congelar ni agitar.
- Protegir de la llum.

MANTENIR ELS MEDICAMENTS FORA DE L'ABAST DELS NENS.

Per a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals
Telèfon directe: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, novembre de 2005.


Cómo utilizar correctamente

Aranesp® SureClick™

Escoja el lugar de inyección



Retire el protector gris



A.



Coloque SureClick™ en el lugar de inyección en ángulo recto (90°) y manténgalo presionado firmemente contra la piel.

B.



Pulse y suelte inmediatamente el botón rojo de activación. Oirá un "click". No levante SureClick™ de su posición.

Click!



Después de 15 segundos o tras escuchar un segundo "click" (lo que ocurra primero) ya puede levantar SureClick™ del lugar de inyección.