

INFORMACIÓ SOBRE EPREX® (Eritropoietina alfa, xeringues de 10.000 UI)

Medicament per a tractar l'anèmia, ajuda al cos a produir glòbuls vermells

¿Com s'ha d'administrar aquest medicament?

- Treure de la nevera el medicament 20 minuts abans d'administrar-lo, així s'administrarà a temperatura ambient.
- S'administra per via subcutània (sota la pell) a les extremitats o a la panxa, cada dosi a un lloc diferent del cos. Treure l'aire primer d'administrar.
- Si s'oblida d'administrar-se una dosi pot posar-se-la durant el mateix dia. No posar-se dues dosi en un mateix dia.

¿Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Eprex®?

Parli urgentment amb el seu metge si nota:

- Dolor intens al pit.
- Envermelliment de la pell, picor o butllofes
- Dificultat al respirar, o respiració irregular.

Parli també amb el seu metge si nota cap altra molèstia, com: diarrea, símptomes gripals, mal de cap, malestar al estómac, nàusees.

¿Quan NO s'ha de prendre aquest medicament?

- Si ha presentat cap reacció al·lèrgica a aquest medicament.
- Si te hipertensió no ben controlada.

Consideracions amb altres medicaments o aliments durant el tractament amb Eprex®

- Durant aquest tractament es necessari menjar aliments que continguin ferro, com ous, carn, lleties, espinacs,...
- També es deu prendre suplement de ferro.

¿Com s'ha de conservar el Eprex®?

- A la nevera (2-4°C). No congelar ni agitar.
- Protegir de la llum.
- MANTENIR ELS MEDICAMENTS FORA DE L'ABAST DELS NENS.

Per a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals

Telèfon directe: 93-2607808

L'Hospitalet de Llobregat, març de 2003.