

INFORMACIÓ SOBRE IRESSA® (Gefitinib, comprimits 100mg)

Com s'ha de prendre aquest medicament?

- Pot prendre els comprimits amb o sense aliments.
- Si s'oblida de prendre una dosi, prengui-la el més aviat possible. No la prengui si est prop de la següent dosi. No doblar la dosi per compensar.

Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Iressa®?

Parli amb el seu metge si nota:

- Reaccions al·lèrgiques: picor de cara, mans inflades, sequedat de pell, erupcions cutànies.
- Problemes de visió o mal d'ulls.
- Mal de panxa fort o diarrees importants.
- Pèrdua d'apetit
- Augment sobtat de problemes respiratoris, de tos o febre.

Aquest tipus de medicaments poden provocar nàusees o vòmits fins i tot abans de prendre'ls, si li passa parli amb el seu metge per prevenir o controlar aquestos efectes. Encara que si les nàusees i els vòmits son importants parli ràpidament amb el seu metge.

Parli també amb el seu metge si nota cap altra molèstia.

Quan NO s'ha de prendre aquest medicament?

- En cas d'al·lèrgia a algun dels components del medicament.
- Dones embarassades. Utilitzi mètodes anticonceptius eficaços durant aquest tractament.

Es poden prendre altres medicaments amb Iressa® ?

Pregunteu al vostre metge o farmacèutic abans de prendre cap altra medicació. Es important que el seu metge sàpiga que està prenent:

- Tractaments per infeccions fúngiques com: fluconazol, itraconazol.
- Medicaments per la cremor d'estómac: ranitidina, cimetidina.

Aquesta no es una llista complerta de fàrmacs que poden alterar l'efecte del Iressa®. Per tant es important consultar amb el metge abans de començar cap altre tractament fins i tot vitamines .

Com s'ha de conservar el Iressa®?

- A temperatura ambient (<30°C) i en el seu envàs original.
- Protegir-lo de la llum, del calor excessiu i de la humitat.

MANTENIR FORA DE L'ABAST DELS NENS.