

INFORMACIÓ FARMACOTERAPÈUTICA DISPENSACIÓ AMBULATORIA

SERVEI DE FARMÀCIA
Hospital Duran i Reynals

INFORMACIÓ SOBRE GLIVEC® (Imatinib, comp 100mg)

¿Com s'ha de prendre aquest medicament?

- Amb aliments i amb un gran got d'aigua
- Prendre la càpsula sencera, no obrir-la ni escalfar-la
- Si s'oblida de prendre una dosi i han passat fins a 4 hores es pot prendre amb aquell moment. Però si han passat més de 4 hores, no es pren aquesta dosi oblidada i es continua el tractament amb la següent dosi. No doblar la dosi per compensar.

¿Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Glivec®?

Parli amb el seu metge si nota:

- Reaccions al·lèrgiques: picor d'ulls o més llàgrimes, cara o mans inflades, sequedat de pell, erupcions cutànies.
- Retenció de líquids (edemes), augment ràpid de pes.
- Visió borrosa, es recomana precaució amb la conducció de cotxes i altres maquinàries.
- Canvi en el color, la quantitat de l'orina o la freqüència.
- Abdomen inflat o amb dolor.
- Altres: pèrdua d'apetit, mal de cap, pell o ulls grocs, nàusees o vòmits, rampes o dolors musculars.

Parli també amb el seu metge si nota cap altra molèstia.

¿Quan NO s'ha de prendre aquest medicament?

- En cas d'al·lèrgia a algun dels components del medicament.
- Dones que estan alletant.
- Dones embarassades, excepte si fos estrictament necessari.

¿Es poden prendre altres medicaments amb Glivec® ?

Pregunteu al vostre metge o farmacèutic abans de prendre cap altra medicació.

Es important que el seu metge sàpiga que està prenent:

- Analgèsics i preparats antigripals amb paracetamol
- Antibiòtics i antifúngics (eritromicina, claritromicina, metronidazol, rifabutina, rifampicina,...)
- Medicació per al control de la natalitat (anticonceptius)
- Medicació per al cor (amiodarona) o per a la pressió arterial.
- Medicaments per a controlar el colesterol.
- Medicaments per a la epilèpsia
- Sedant i medicació per a la depressió.
- Corticoides com prednisona o dexamentasona.
- Altres: omeprazol, ondansetron, cimetidina, ciclosporina, tacrolimus, fentanilo.

Aquesta no es una llista completa de fàrmacs que poden alterar l'efecte del Glivec®, per tant es important consultar amb el metge abans de començar cap altre tractament.

¿Com s'ha de conservar el Glivec®?

- A temperatura ambient (<30°C) i en el seu envàs original.
- Protegir-lo de la llum, del calor excessiu i de la humitat.

MANTENIR FORA DE L'ABAST DELS NENS.

Per a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals
Telèfon directe: 93-2607808

L'Hospitalet de Llobregat, març de 2003.