

INFORMACIÓ SOBRE LOMUSTINA® (Lomustina càpsules de 40mg)

¿Com s'ha de prendre aquest medicament?

- ◆ Prengui les càpsules en dejú, es a dir, 1 hora abans o dues hores després dels menjars.
- ◆ Prengui tota la dosi d'un cop, és recomanable prendre-la abans d'anar a dormir i axis al llit les nàusees que produeix son menys molestes.
- ◆ Si vomita immediatament després de prendre la dosi, parli amb el seu metge.

Consideracions especials amb aquest tractament:

- ◆ Pregunti al seu metge o farmacèutic abans de prendre altres medicaments.
- ◆ No trenqui ni obri les càpsules. Si s'obri la càpsula i pren contacte amb la pols de dintre rentis amb molta aigua.
- ◆ Parli amb el seu metge abans de qualsevol vacunació o pendre medicacions no consultades abans.
- ◆ Si s'oblida de prendre el medicament parli amb el seu metge.
- ◆ Eviti begudes alcohòliques durant el tractament.
- ◆ Eviti aglomeracions estar amb contacte amb gent refredada o que tingui altres infeccions, ja que mentre duri el tractament amb lomustina es més sensible a les infeccions.
- ◆ Faci una higiene bucal adequada, amb raspall de dents suau.
- ◆ Tant si es dona com si es home prengui mesures anticonceptives eficaces durant aquest tractament.

¿Quan NO s'ha de prendre Lomustina?

- ◆ Si ha tingut una reacció al·lèrgica a la Lomustina.
- ◆ Si està embarassada o alletant. Si sospita que pot estar embarassada, comunica-ho al seu metge.

¿Quins possibles efectes secundaris es poden presentar amb aquest tractament i que fer en cas de que apareguin?

- ◆ Parli immediatament amb el seu metge si te una reacció al·lèrgica (envermelliment de la pell, dificultat al respirar, ...), sang a l'orina, febre, mal de gola, confusió, hemorràgies (nasals,...), diarrea greu, molèsties bucals que no li permeten prendre ni líquids.
- ◆ Consulti al seu metge si nota: perduda de gana, caiguda del cabell.
- ◆ Altres efectes secundaris comuns son: nàusees i vòmits, desorientació, somnolència, molèsties bucals.

¿Com s'ha de conservar el Lomustina?

- ✓ S'ha de conservar a temperatura ambient i dins del envàs original.
- ✓ Protegit del calor i de la llum directa.

MANTENIR ELS MEDICAMENTS FORA DE L'ABAST DELS NENS.

Par a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals
Telèfon directe: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, Juliol-2003.