

INFORMACIÓ FARMACOTERAPÉUTICA DISPENSACIÓ AMBULATÒRIA

SERVEI DE FARMÀCIA
Hospital Duran i Reynals

INFORMACIÓ SOBRE ONTOSEIN® (Orgoteina, vial de 8 mg)

Medicament per a prevenir i tractar els efectes secundaris de la radioteràpia en tumors de bufeta.

¿Com s'ha d'administrar aquest medicament?

- Prevenció: 4-8mg via intramuscular després de la sessió de radioteràpia.
- Tractament: 4-8mg via intramuscular tres cops setmana fins desaparició dels símptomes (màxim 7 setmanes).

¿Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Ontosein®?

Parli urgentment amb el seu metge si nota: Reacció al·lèrgica generalitzada.

Altres efectes secundaris lleus son: envermelliment, dolor o picor al lloc d'injecció.

¿Quan NO s'ha de prendre aquest medicament?

- Si ha presentat cap reacció al·lèrgica a aquest medicament.
- Malaltia de Wilson.

MANTENIR ELS MEDICAMENTS FORA DE L'ABAST DELS NENS.

Per a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals

Telèfon directe: 93-2607808

L'Hospitalet de Llobregat, març de 2003.