

INFORMACIÓ SOBRE NEULASTA® (PEGFILGRASTIM, xeringues de 6 mg)

**Com s'ha d'administrar aquest medicament?**

- ✓ Injecció subcutània, per sota de la pell. L'administració serà aproximadament a la mateixa hora cada dia del tractament.
- ✓ Els llocs més adients per a l'administració són la part posterior dels avantbraços, part superior de les cuixes i la panxa, evitant prop del melic.
- ✓ Canviï cada vegada el lloc de injecció.

**Administració**

- ✓ Treure el medicament de la nevera 30 minuts abans de punxar-se.
- ✓ Rentis acuradament les mans
- ✓ Abans d'injectar el medicament treure la coberta de l'agulla i dirigint-la cap a dalt treure les butllofes d'aire si hi ha.
- ✓ Desinfecti la pell amb cotó amb alcohol i pessigui la pell.
- ✓ Punxi la pell introduint tota la agulla.
- ✓ Injecti el líquid lentament mantenint pessigada la pell.
- ✓ Després d'injectar el medicament retiri l'agulla i deixi anar la pell, desinfectant-la amb un cotó net amb alcohol.
- ✓ Finalment posi la xeringa usada a un recipient adient.

Altres consideracions a l'inici d'aquest tractament:

- ✓ Si està embarassada, creu que pot estar-ho o ho està intentant comuniqui-ho al seu metge.
- ✓ Si s'oblida una dosi consulti amb el seu metge, no prengui una dosi doble per a compensar.
- ✓ No compartir agulles, xeringues o medicació amb ningú. Llenci les agulles i xeringues utilitzades en un dipòsit adient.
- ✓ Informe al seu metge o farmacèutic si pren cap altre medicament.

**Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Neulasta®?**

- ✓ Deixi de administrar-se aquest medicament i contracti immediatament amb el seu metge si: nota al·lèrgia generalitzada (picor i envermelliment per tot el cos, dificultat al respirar, pols ràpid o sudoració).
- ✓ Parli amb el seu metge si nota: febre, refredat, sagnat o blaus infreqüents, picor a la pell, butllofes als llavis, boca o cara, mal de panxa, dolor al orinar.
- ✓ Altres símptomes lleus: dolor muscular (cames, esquena,...), nàusees, vòmits, perdre la gana, dolor o envermelliment al lloc d'injecció, mal de cap, diarrea.

**Quan NO s'ha d'administrar aquest medicament?**

- ✓ Si és al·lèrgic al pegfilgrastim o algun dels seus components.
- ✓ Si està alletant.

**Com s'ha de conservar el Neulasta®?**

- ✓ A la nevera, no al congelador.
- ✓ Protegit de la llum directa.

MANTENIR ELS MEDICAMENT FORA DE L'ABAST DELS NENS

Per a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals  
Telèfon directe: 93-2607808

L'Hospitalet de Llobregat, abril de 2004.