

INFORMACIÓ SOBRE NATULAN® (Procarbazina càpsules de 50mg)

¿Com s'ha de prendre aquest medicament?

- ◆ Prengui la dosi indicada pel seu metge amb molta aigua.
- ◆ Si vomita immediatament després de prendre la dosi, parli amb el seu metge.

Consideracions especials amb aquest tractament:

- ◆ Pregunti al seu metge o farmacèutic abans de prendre altres medicaments.
- ◆ No es recomana menjar formatge durant aquest tractament.
- ◆ Parli amb el seu metge abans de qualsevol vacunació.
- ◆ Si s'oblida de prendre una dosi, prengui-la el més aviat possible. Si esta prop de la següent dosi no prengui la dosi oblidada ni doble la dosi per a compensar.
- ◆ Eviti begudes alcohòliques durant el tractament.
- ◆ Eviti aglomeracions estar amb contacte amb gent refredada o que tingui altres infeccions, ja que mentre duri el tractament amb lomustina es més sensible a les infeccions.
- ◆ Prengui mesures anticonceptives eficaces durant aquest tractament.
- ◆ No es recomana conduir vehicles ni màquines pesades per la somnolència que produeix la procarbazina.

¿Quan NO s'ha de prendre Procarbazina?

- ◆ Si ha tingut una reacció al·lèrgica a la procarbazina.
- ◆ Si està embarassada o alletant. Si sospita que pot estar embarassada, comunica-ho al seu metge.

¿Quins possibles efectes secundaris te Procarbazina i que fer en cas de que apareguin?

- ◆ Parli immediatament amb el seu metge si te una reacció al·lèrgica (envermelliment de la pell, dificultat al respirar, ...), febre, mal de gola, hemorràgies (nasals,...), diarrea greu, molèsties bucals que no li permeten prendre ni líquids, confusió.
- ◆ Consulti al seu metge si nota: hematomes o hiper-pigmentació de la pell.
- ◆ Altres efectes secundaris freqüents que normalment desapareixen després dels primers dies de tractament son: perduda de gana, nàusees i vòmits.

¿Com s'ha de conservar la Procarbazina?

- ✓ A temperatura ambient i dins del envàs original.
- ✓ Protegit del calor, de la humitat i de la llum directa.

MANTENIR ELS MEDICAMENTS FORA DE L'ABAST DELS NENS.

Par a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals
Telèfon directe: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, Juliol-2003.