

**INFORMACIÓ SOBRE AGRYLIN® (Anagrelide, càpsules de 0.5)**

Aquest medicament s'utilitza per a reduir el nombre de plaquetes a la sang, per al tractament d'una alteració sanguínia que s'anomena trombocitemia.

**¿Com s'ha de prendre aquest medicament?**

- ◆ La càpsula s'ha de prendre sencera, no deu obrir-se ni mastegar-la.
- ◆ Si s'oblida de prendre una dosi, prengui-la el més aviat possible, sempre que estigui dins del mateix dia. Si ha passat més d'un dia no la prengui, no prengui doble dosi en la següent toma.
- ◆ Es recomana prendre mesures anticonceptives en les dones que estiguin en període fèrtil.
- ◆ Pregunti al seu metge o farmacèutic abans de prendre qualsevol altre medicament, incloent medicació per molèsties lleus (refredat, mal de cap,...)

**¿Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Agrylin®?**

Parli urgentment amb el seu metge si té: una reacció al·lèrgica greu (dificultat per respirar, envermelliment de la pell), palpitations, dolor al pit, inflament peus i turmells.

Altres efectes secundaris lleus que es poden presentar: mal de cap, nàusees, vòmits, diarrea, perduda de la gana, somnolència, cansament, mal de panxa o d'esquena, blaus en més freqüència de l'habitual.

**¿Quan NO s'ha de prendre aquest medicament?**

- ◆ Si ha tingut alguna reacció al·lèrgica l'Agrylin®
- ◆ Si esta embarassada o en període de lactància. Si sospita que pot estar embarassada comunicu-ho al seu metge.

**¿Com s'ha de conservar el Agrylin®?**

Es conserva a temperatura ambient, dins del flascó protegit de la llum.

**MANTENIR ELS MEDICAMENTS FORA DEL ABAST DELS NENS**

Per a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals  
Telèfon directe: 93-2607808  
L'Hospitalet de Llobregat, març de 2003.