

**INFORMACIÓ SOBRE THALIDOMID® (Talidomida, comprimits de 50mg)**

**¿Com es pren aquest medicament?**

- S'ha de prendre al vespre amb aigua i un hora després del sopar.
- Si s'oblida de prendre una dosi, prenga-la el més aviat possible durant el mateix dia. No prendre dosi doble per compensar.
- Durant aquest tractament utilitzi dos mètodes anticonceptius, des de 4 setmanes abans de començar fins a 4 setmanes després de finalitzar el tractament, tant si es home com si es dona. Aquest medicament pot causar defectes en el fetus.
- No es pot veure alcohol durant el tractament amb talidomida.

**¿Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Talidomida?**

Al inici del tractament se presenten en alguns malalts estrenyiment, sedació cansament somnolència, i capacitat de reacció reduïda.

Parli també amb el seu metge si nota: reacció al·lèrgica generalitzada, infeccions, febre, mareig al aixecar-se ràpid, insensibilitat i formigueig a peus i mans, ...

**¿Quan NO s'ha de prendre aquest medicament?**

- Si es dona en període reproductiu i no utilitza dos mètodes anticonceptius.
- Si es home actiu sexualment i no utilitza preservatius.
- Si ha presentat cap reacció al·lèrgica a aquest medicament.
- Si esta embarassada, o pot estar-ho, i si esta alletant.

**Altres consideracions durant el tractament amb Talidomida;**

- Eviti conduir cap vehicle a motor, aquest medicament pot produir somnolència.
- Pregunteu al vostre metge o farmacèutic abans de prendre cap altra medicació.

**¿Com s'ha de conservar la Talidomida?**

- A temperatura ambient
- En l'envàs original, protegir de la humitat i de la llum directa.

**MANTENIR ELS MEDICAMENTS FORA DE L'ABAST DELS NENS.**

Per a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals  
Telèfon directe: 93-2607808  
L'Hospitalet de Llobregat, març de 2003.