

INFORMACIÓ SOBRE TEMODAL® (Temozolamida, càpsules de 5, 20, 100 o 250 mg)

¿Com s'ha de prendre aquest medicament?

- ◆ Prengui les càpsules en dejú.
- ◆ No obri ni mastegi les càpsules. Empassi-les senceres amb l'ajuda d'un got d'aigua.

Consideracions especials amb aquest tractament:

- ◆ Si una càpsula s'obre o es fa mal bé, eviti inhalar els components de la càpsula i el contacte amb pell i mucoses (ulls, nas...). Si aquest contacte es produís renti la pell que ha estat en contacte amb aigua i sabó, i el nas i ulls sols amb aigua.
- ◆ És possible que li prescrivin altre medicament per a prendre abans o després de Temodal® per evitar o controlar les nàusees que es poden presentar.
- ◆ Si s'oblida de prendre una dosi, prengui-la el més aviat possible durant el mateix dia. No dupliqui la següent dosi, faci-ho únicament en cas de que el seu metge així ho indiqui.
- ◆ Es recomana prendre mesures anticonceptives tant en homes com en dones.
- ◆ Pregunti al seu metge o farmacèutic abans de prendre altres medicaments, incloent medicació per a molèsties lleus (refredat, mal de cap, ...), vitamines i "herbes medicinals". Informe al seu metge si ja les esta prenent.
- ◆ Parli amb el seu metge abans de qualsevol vacunació.

¿Quan NO s'ha de prendre Temodal®?

- ◆ Si ha tingut una reacció al·lèrgica a temozolamida o a algun dels components de les càpsules d'aquest medicament (excipients com la lactosa, o de la càpsula com la gelatina).
- ◆ Si es al·lèrgic a dacarbazina.
- ◆ Si està embarassada o alletant. Si sospita que pugui estar embarassada, comuniqui-ho al seu metge.

¿Quins efectes adversos poden aparèixer amb aquest tractament i què fer en cas de que apareguin?

El tractament amb Temodal® disminueix el número de determinats tipus de cèl·lules sanguínies fet que pot augmentar el risc de patir hemorràgies o hematomes, anèmia, febre o infeccions.

- ◆ Contacti immediatament amb el seu metge si té una reacció al·lèrgica greu (envermelliment de la pell, dificultat al respirar, ...).
- ◆ Consulti al seu metge si té febre, nàusees o vòmits, mareig, somnolència, debilitat, sagnats i/o hematomes importants.
- ◆ Altres efectes adversos que es poden presentar amb el tractament amb Temodal®: pèrdua de gana o pes, diarrea, erupció cutània, dolor, caiguda de cabell, calfreds, picor, o alteracions del gust.

¿Com s'ha de conservar el Temodal®?

- ✓ Conservi'l a temperatura ambient i dins del envàs original.

MANTENIR ELS MEDICAMENTS FORA DE L'ABAST DELS NENS.

Par a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals
Telèfon directe: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, març de 2003.