

INFORMACIÓ SOBRE VESANOID® (Tretinoïna, comprimits de 10mg)

¿Com s'ha d'administrar aquest medicament?

- S'ha de prendre la dosi diària dividida en dos cops al dia i amb els àpats.
- Si s'oblida de prendre una dosi, prengui-la el més aviat possible sempre que no estigui prop la dosi següent. No prendre dosi doble per compensar.

¿Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Vesanoïd?

Contacte immediatament amb el seu metge si nota: febre inexplicable, problemes respiratoris, problemes de visió, fort mal de cap, mal al pit, mal d'ossos, picor i envermelliment generalitzat a la pell.

Parli també amb el seu metge si nota: pell seca, boca seca, pèrdua de gana, nàusees, vòmits, mal de cap, debilitat i cansament.

¿Quan NO s'ha de prendre aquest medicament?

- Si ha tingut cap reacció al·lèrgica a la tretinoïna, a la vitamina A o algun derivat d'aquesta vitamina.
- Si esta embarassada, o pot estar-ho, aquest medicament pot produir malformacions al fetus.
- Si esta alletant.

Altres consideracions durant el tractament amb Vesanoïd.

- No es convenient conduir vehicles a motor i utilitzar maquinaries, ja que aquest medicament pot produir mareig o mal de cap important.
- Pregunteu al vostre metge o farmacèutic abans de prendre cap altra medicació.

¿Com s'ha de conservar el Vesanoïd ?

- A temperatura ambient
- En l'envàs original, protegir del calor i de la llum directa.

MANTENIR ELS MEDICAMENTS FORA DE L'ABAST DELS NENS.

Per a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals
Telèfon directe: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, juny de 2003.