

**INFORMACIÓ SOBRE VESANOID® (Tretinoïna, comprimits de 10mg)**

**¿Com s'ha d'administrar aquest medicament?**

- S'ha de prendre la dosi diària dividida en dos cops al dia i amb els àpats.
- Si s'oblida de prendre una dosi, prengui-la el més aviat possible sempre que no estigui prop la dosi següent. No prendre dosi doble per compensar.

**¿Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Vesanoïd?**

Contacte immediatament amb el seu metge si nota: febre inexplicable, problemes respiratoris, problemes de visió, fort mal de cap, mal al pit, mal d'ossos, picor i envermelliment generalitzat a la pell.

Parli també amb el seu metge si nota: pell seca, boca seca, pèrdua de gana, nàusees, vòmits, mal de cap, debilitat i cansament.

**¿Quan NO s'ha de prendre aquest medicament?**

- Si ha tingut cap reacció al·lèrgica a la tretinoïna, a la vitamina A o algun derivat d'aquesta vitamina.
- Si esta embarassada, o pot estar-ho, aquest medicament pot produir malformacions al fetus.
- Si esta alletant.

Altres consideracions durant el tractament amb Vesanoïd.

- No es convenient conduir vehicles a motor i utilitzar maquinaries, ja que aquest medicament pot produir mareig o mal de cap important.
- Pregunteu al vostre metge o farmacèutic abans de prendre cap altra medicació.

**¿Com s'ha de conservar el Vesanoïd ?**

- A temperatura ambient
- En l'envàs original, protegir del calor i de la llum directa.

**MANTENIR ELS MEDICAMENTS FORA DE L'ABAST DELS NENS.**

Per a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals  
Telèfon directe: 93-2607808  
L'Hospitalet de Llobregat, juny de 2003.