

INFORMACIÓ SOBRE VFEND® (Voriconazol, comprimits 200mg)

Com s'ha de prendre aquest medicament?

- Prengui els comprimits indicats pel metge en dejú, es a dir, 1 hora abans o dues hores després dels menjars.
- Els comprimits s'han de tragar sencers amb aigua i no mastegar-los.
- Si s'oblida de prendre una dosi, prengui la següent quan li toqui. No doblar la dosi per compensar.

Quins efectes secundaris es poden presentar en el tractament amb Vfend®?

- Parli immediatament amb el seu metge si presenta erupció greu de la pell o ampolles.
- Comuniqui al seu metge si té dolor d'estómac o si la femta presenta una consistència diferent.
- Alteracions més freqüents: Alteracions de la visió, febre, erupció a la pell, nausees, vòmits, diarrea, mal de cap, inflamació de les extremitats.
- Altres: canvis en pressió sanguínia, canvis en el ritme cardíac, mareig, picor, debilitat, mal d'esquena, símptomes gripals, tos, formigueig.

Parli amb el seu metge si qualsevol d'aquests efectes adversos persisteix o son molestos. Parli també amb el seu metge si nota cap altra molèstia.

Quan NO s'ha de prendre aquest medicament?

- En cas d'al·lèrgia a algun dels components del medicament.
- Dones que estan alletant.
- Dones embarassades, excepte si fos estrictament necessari.

Es poden prendre altres medicaments amb Vfend®?

- Pregunteu al vostre metge o farmacèutic abans de prendre cap altra medicació.
NO HA DE PRENDRE cap d'aquests medicaments mentre estigui en tractament amb Vfend®:
 - Terfenadina, i Astemizol (utilitzats per l'al·lèrgia)
 - Carbamazepina (per a les convulsions)
 - Cisaprida (per a problemes digestius).
 - Pimozida (per a trastorns mentals).
 - Quinidina (per a arritmies cardíques)
 - Rifampicina (pel tractament de la tuberculosi).
 - Fenobarbital (per l'insomni greu i les convulsions).
 - Alcaloids ergotamínics (p. Ex. Ergotamina, dihidroergotamina; utilitzats per a la migranya).
 - Sirolimus (per a pacients trasplantats)
- Comuniqui al seu metge si està prenent qualsevol dels medicaments següents, ja que pot ser necessari un ajust de la dosi:
 - Rifabutina (utilitzat pel tractament de la tuberculosi)
 - Fenitoïna (utilitzat per a tractar l'epilepsia)
- Comuniqui també al seu metge si està prenent qualsevol dels medicaments següents:
 - Warfarina i altres anticoagulants (fenprocumon, acenocumarol; utilitzats per a disminuir la coagulació de la sang).
 - Ciclosporina, Tacrolimus (utilitzat per a pacients trasplantats)
 - Sulfonilurees (per a la diabetes)
 - Estatines (per a reduir els nivells colesterol)
 - Benzodiacepines (per l'insomni greu i l'ansietat)
 - Omeprazol (pel tractament de les úlceres)

Com s'ha de conservar el Vfend®?

- A temperatura ambient (<30°C) i en el seu envàs original.
- Protegir-lo de la llum, del calor excessiu i de la humitat.

MANTENIR FORA DE L'ABAST DELS NENS.

Per a qualsevol consulta trucar al Servei de Farmàcia. Hospital Duran i Reynals
Telèfon directe: 93-2607808
L'Hospitalet de Llobregat, abril de 2004.